

AMPLIACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE *LIOLAEMUS CHACOENSIS* (SHREVE, 1948) (IGUANIA: LIOLAEMIDAE) EN EL CHACO BOLIVIANO.

EXTENSION OF THE DISTRIBUTION OF *LIOLAEMUS CHACOENSIS* (SHREVE, 1948) (IGUANIA: LIOLAEMIDAE) IN THE BOLIVIAN CHACO.

Alvaro J. Aguilar-Kirigin y Mauricio Ocampo

Colección Boliviana de Fauna, Área de Herpetología, Campus Universitario de Cota Cota, Calle 27 s/n. La Paz, Bolivia. aguilarkirigin@gmail.com

Palabras clave: Liolaemidae, *Liolaemus chacoensis*, distribución, Chaco boliviano.

Key words: Liolaemidae, *Liolaemus chacoensis*, distribution, bolivian Chaco.

Liolaemus chacoensis es una lagartija que se caracteriza por la presencia de un falso parche femoral, escamas temporales quilladas, presencia de un pliegue longitudinal irregular, un corto pliegue antehumeral curvado y manchas oscuras en forma de V en la región dorsal (Shreve, 1948; Ceí, 1980; Ceí, 1993; Lavilla *et al.*, 1995).

La localidad tipo de la especie es Fortín Guachalla, Río Pilcomayo (Shreve, 1948), conocido actualmente como Pedro P. Peña (Langstroth, 2005), en la región Chaqueña de la República del Paraguay, aproximadamente a 60 km de la frontera con Bolivia.

La especie es bien conocida en la región chaqueña tanto en Argentina como en Paraguay (Ceí, 1993; Lavilla *et al.*, 1995; Cruz y Ramírez-Pinilla, 1996; Avila *et al.*, 2000). En una revisión de la saurofauna boliviana, Langstroth (2005) consideró esta especie de probable presencia en el país. Posteriormente Gonzales *et al.* (2006), reportan el nuevo registro para Bolivia en la Reserva Natural El Corbalán-Tarija (frontera con Paraguay), cuyo espécimen está depositado en el Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado (MNKR-3760).

Sobre la base de dos ejemplares hembras depositadas en la Colección Boliviana de Fauna (CBF) nosotros ampliamos la distribución de la especie en el chaco boliviano. Los ejemplares presentan longitudes hocico-cloaca de 44.23 mm (CBF-772) y 41.67 mm (CBF-1022) y fueron coleccionados en fecha 18/08/91 en el departamento de Tarija, Provincia Gran Chaco, Localidad Quemado (Estancia Bolívar) 21° 38' S, 62° 34' W. Esta localidad representa el segundo registro de la especie en el país y amplía en 10.7 Km al W de la reportada por Gonzales *et al.* (2006).

Literatura citada

- AVILA, L.J., R. MONTERO, & M. MORANDO. 2000. Categorización de las lagartijas y anfibios de Argentina. Pp. 51-74, *en*: Categorización de los anfibios y reptiles de la República Argentina (E.O. Lavilla, E. Richard y G.J. Scrocchi, eds.). Asociación Herpetológica Argentina, San Miguel de Tucumán, Argentina, 97 pp.
- CEI, J.M. 1993. Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina. Herpetofauna de las selvas subtropicales, Puna y Pampas. Monografía XIV. Museo Regionale di Scienze Naturali, Torino, 949 pp.

- CEI, J.M. 1980. On the conspecificity of the Iguanid lizards *Liolaemus chacoensis* and *Liolaemus emmae*. Copeia, 1980(4):936-937.
- CRUZ, F.B., & M. RAMÍREZ-PINILLA. 1996. Actividad reproductiva en el lagarto *Liolaemus chacoensis* (Sauria, Tropiduridae), del Chaco occidental, Salta, Argentina. Revista Española de Herpetología, 10:33-39.
- GONZALES, L., A. MUÑOZ, & E. CORTEZ. 2006. Primer reporte de la herpetofauna de la Reserva Natural "El Corbalán", Tarija, Bolivia. Kempffiana, 2(1):72-94.
- LANGSTROTH, R.P. 2005. Adiciones probables y confirmadas para la saurofauna boliviana. Kempffiana, 1(1):101-128.
- LAVILLA, E.O., F.B. CRUZ, & G.J. SCROCCHI. 1995. Amphibiens et reptiles de la Station Biologique "Los Colorados" dans la province de Salta, Argentine (2^e partie). Revue française d'Aquariologie et Herpetologie. 22(3-4):117-128.
- SHREVE, B. 1948. A new *Liolaemus* from Paraguay. Copeia, 1948(2):111-112.